PRESENCIA DE *LEPTOTELEIA MARCELAE* MASNER 1978 (HYMENOPTERA: PROCTOTRUPOIDEA) EN ARGENTINA

La distribución geográfica de esta especie abarcaba el este de Brasil y Paraguay y en la presente nota se amplía para las localidades de Loreto y Azara, Provincia de Misiones. República Argentina.

Según destaca Masner, la presencia de ejemplares de éste género en las colecciones es bastante rara, debido a los hábitos particulares de los adultos. Las especies cuya biología se conoce se comportan como endoparásitos de Grilloidea. Las hembras permanecen en las ramitas donde deponen sus huéspedes y es dificultoso obtenerlos con los métodos habituales de recolección.

En la colección del Doctor Ogloblin, depositada en la División Entomología del Museo de La Plata, se hallan 10 ♀♀ y 4 ♂♂ recolectados entre los años 1929 y 1935 en las dos localidades arriba citadas.

Las especies de *Leptoteleia* Kieffer compiten con las de otro escelionino del género *Oethecoctonus* Ashmead, por posturas de huéspedes comunes, por lo cual Masner afirma que esto determina una morfología semejante y considera a estos géneros como un ejemplo típico de paralelismo ecológico.

Con respecto a *Oethecoctonus,* no hallamos en la literatura registros referidos a nuestro país; sin embargo, en las colecciones del Museo de La Plata se hallan depositados ejemplares recolectados en las Provincias de Buenos Aires y Misiones (República Argentina) que no pueden referirse a las especies conocidas, y es probable que se trate de nuevos taxa, los cuales serán tratados próximamente.

Marta Loiácono y Susana Mulvany
Museo de La Plata